

فى المحاضره اللى فاتت المفروض إننا خلصنا ال schistosoma وبفكركم ال parasite آخر schistosoma فى مجموعه ال trematoda وبفكركم إنها 3 أنواع

1)haematobium

موجوده فى شبكه الأورده اللى فى ال urinary tract

2)mansoni

حوالين ال veins of large intestine

3) japonicum

موجوده زى ال mansoni بس مش موجوده فى بلدنا

ربنا خلق أنواع تانيه من ال schistosoma تصيب المواشي وتعمل فيه منفس المشكله اللى بتعملها فى الإنسان وطريقه العدوي نفس الطريقه لما الفلاح ياخذ البقره أو الجاموسه ويحميها فى مياه فيها cercaria ومش بتاعه ال 3 أنواع اللى قولنا عليهم يقدروا يخرقوا جلد البقره أو الجاموسه وتعمل schistosomiasis

وممكن تنتى بموتهم بما إنها تصيب الحيوانات يبقى ملهاش دعوه بيهم ولكن إحنا ممكن يحصلنا مشكله لو الفلاح نزل مع البقره وال cercaria دخلت بالخطأ فى جلد الإنسان أول ما تدخل تكتشف إنها دخلت بالغلط لأن ربنا مخلقهاش عسان تدخل جسم الإنسان اللى بيحصل إن ال cercaria بتاعه ال nonhuman species دخلت ال skin ولما بتدخل مش بتعرف تكمل النمو بتاعها ولا بتعرف تخرج....المشكله بيجي العيان فى العياده عنده ال skin lesion (نقط_حبوب)

مكان ما دخلت ال cercaria وبتقضي الفتره بتاعتها لحد ما تموت جوا جسم الإنسان وتنتهى المشكله على كده

لو حبيننا نعرف ال cercarial dermatitis

هنقول دى condition بتحصل بسبب penetration ل non human species of schistosoma

لازم نبقي متأكدين إن ال cercaria دى مش بتقدر تكمل فى جسمنا

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

العيان هي جيانا مكان ما دخلت ال *cercaria* بيهرش والحتة نفسها *inflamed*
ومحمره لو مهتمش تدخل بكتريا فيها وتعمل *secondary bacterial*
infection

هيعمل إيه الدكتور عيان يعالجه ؟

هيديله

1) Antipuritics حاجة تقلل الهرش

2) antihistaminics حاجة تقلل الحساسيه

3) antibiotics ما يحصلش infection عشان ال

نيجي بعد كده ندخل على حاجة جديده ندخل على ال cestodes

هنقول كام حاجة كده *biology* للفهم بس مش للإمتحان

Cestodes

Tape worms الدودة الشريطيه

General characters:

Flat and segmented. و دي اهم حاجة انهم متقسمين.

small intestine اول ما اسمع cestodes بتعيش في ال

intestinal cestodes ال cestodes اللي بتعيش في الانسان دي بنسميها

extra intestinal cestodes وال adult cestodes اللي بتعيش بره جسم الانسان بنسميها

Hermaphrodite (male and female genital systems in the same body)

6 adult cestodes live in small intestines of man: intestinal cestodes

5 adult cestodes live in the small intestines of animals & their larvae

are found in tissues of man: extraintestinal cestodes

ال cestodes جسمها يتكون من

1)scolex

بيثبت الدودة الطويله في ال mucosa of small intestine

2)mature segments

في النص هنلاقي فيها male and female genital organs

من ضمن أجزاء ال female genital organs uterus بيبقى موجود بس مش شغال
لما ال genital system بيشتغل وال sperms يfertilize ال ovum ويتحول ل egg

اول ما تدخل ال egg في ال uterus ال uterus بتاعها بيبقى مقفول فا بيتملى بال eggs
ويبقى فيه excess eggs بيحصله expand وبيغط على ال other genital organs
فايحصله حاجه هتاخدوها في ال pathology اسمها fraction atrophy ويتحللوا ويختفوا
خالص ونبص نلاقي دخلنا في ال gravid segment هنص نلاقي كيس مليان بالبيض

طبعاً ال enlargement ده بيختلف من cestoda للتانيه ونعرف نفرق بينهم بس في
العملى

هنبداً باول cestoda تعيش في ال small intestine اسمها طويل شويه

Diphyllobothrium latum

di)2 phyllo)leaf like bothrium)groove
latum)broad

Geog. Distribution: **التوزيع الجغرافي**

Lake regions in Europe and America

Life cycle:

معظم الإصابات بتحصل في الصيادين بي defecate في المياه
وكل ال animals اللي بتاكل ال fishes مصابه بالمرض

ال egg بتنزّل في ال water لما بتنزّل في ال water بتخلق
الجنين اسمه coracidium على وزن meracidium

ال *coracidium* يتغذى عليه ال *cyclops* ويتحول لشكل

proceroid larva و يتحول اسمها ل

الكائنات الموجودة في المياه زى *salmon* يتغذى على ال

cyclops يصاب بالمرض اى انسان بياكل السمك ده يصاب

بالمرض عن طريق ال *plerocercoid larva (infective stage)*

بالنسبة ليا ال *infective stage* هي ال *plerocercoid larva*

Infected man or fish-eating animals → defecation in water → Egg in stool → coracidium develops → which is swallowed by Cyclops → proceroid larva develop inside Cyclops → the larva infects fish and plerocercoid larva develops inside fish → ingestion of not properly cooked infected fish ...

Definitive host: man

Reservoir host: fish-eating animals

Diagnostic stage: Eggs in stool

1st intermediate host: Cyclops و دي حشرة صغيرة جدا

2nd intermediate host: fish (like salmon)

Infective stage: plerocercoid larva

Pathogenesis & clinical picture:

1) Asymptomatic (if mild infection) يعني مش هيظهر عليه حاجة

2) Intestinal Disturbance

As colic, hunger pains, nausea, vomiting, diarrhea & loss of appetite_

(3) لو عددها كبير هتعمل intestinal obstruction

4) Pernicious anemia due to:

-Toxins secreted by the parasite

بتأثر على ال bone marrow عشان كده بتقلل تكوين كرات الدم الحمراء عن طريق ال toxins اللي بتطلعها

-Vit.B12 deficiency بيهتم جدا بال فيتامين 12 انه ياخده ليه هو

Diagnosis:

1)stool analysis:

1-egg in stool:

Size 70 x 50 micro

Shape oval, operculated & thick shelled

Color yellowish brown

2-mature segment in stool

في اول الكتاب بيقوله عن ال di phyllobothrium latum انها cestodes كاذبه عشان فيها صفات كتير من ال trematodes يعني مثلا بتنزل ال egg في ال water عشان تكمل ال development

2)Blood analysis: anemia لو خدنا منه عينه دم هنلاقي عنده

Treatment: praziquental + vitamin B12

لازم نديله b12 عشان زي ما قولنا ال parasite دة بياخد ال B12 لنفسه

مش مطلوب منا حفظ ال dose بتاع الدواء ولا حتى في ال pharma

Prevention and control:

1)sanitary disposal of human excreta

2)proper cooking of fish

3)proper freezing of fish

4) treatment of infected patients & health education

Flash notes